
01 V4







Désignation: Chancepe Clos 10 Planche & Rang 5 2 Souche Vigueur : Date de Váraison: 78.63 Date de Maturité : 20,8,63 Pourriture O GRAPPE : G - (1) - P - L - (1) - C. 17 BALE : TG - G - M- P 15x15 (Bi) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 % saveur : @ - m - ar - fox. herb. 8 2 disc - Sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. 930 avec pápins - apyrènes 4 s 5 1 jus : inc. - coloré

Chanconge Désignation : Clos 10 Planche & Rang S souche 2 Vigueur : 3 Date de Véraison : 31.7.64 Date de Maturité 27.869 +2 Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M - C Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M- P. 15415 B1). - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 13 Saveur : 6 - m - ar - fox - her s 25 disc. - (sph) - oll. - Ov. s 30 Obov. - cyl. - fus. 5 41 s 53 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 | 2 3 4 5

n: Charrange. Désignation : Clcs /Oplanche & Rang S Souche & Vigueur : 45 Date de véraison : 12.8.65 Date de maturité \$ 13.9.65 + 4 Pourriture : 1 GRAPPE - G - M - P - L - (6) BAIE: TG - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg. - N. Charge saveur : (s - m - ar - fox - herb. s 1 4 dis. - sph. - (ell). - Ov. Obov. - cyl - fus. avec papins - apyrene s 3 0 s 4 2 jus : inc. - coloré 852 Fédoncule : L- W C-

Annie: 1963
Diplacement: 10.8.5.2.... Désignation Chanronge

	Hombre				J) ;'i				
	total	11.4	!	1	!	1	!!	!	1
1	! faille	Commissioners (Commission of Co	· was strong or or	!		-	!	1	!
×	1	1	!	1	1	!	!!!	!	!
3	! faible	!	1	!	!	!	!	!	!
4	!	!	!	!	1	!	!!	!	!
5	! ! 4	!	!	1	!	!		!	!
		12	į	i	į	į	1	į	

Q le 1. 63 x _4

Année 1965

No Chauronge Planche M. 8 52 Côté

	Nombre	1	0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		A T E			
	tolal.	27-31	31.3	1	1	1	1	1
1	4	3 ×	41					
2	5	1	2					
3	4	31	3 *					
4	5	0	3 4					
5	5	0	1					

D & 31.36TX +3

Annie : 1966 Emplacement . 110 P.882 Désignetion ... chandlonge.....

	Hombre	!			T		and the second s	ه ، بندلست	-
	! total !	1 123	: 16-3	! !	!	!	!	!	!!
1	!4	!	! 2 ×	!	!	-	1 . /	1	!
2	L	1 *	15		1	!	1066	i	1
3	15	: 2	147	1	1	1	N.	į	1
4	17-1	! -	1 '	!	1 0	150	!	i	1
5	! 41	! -	124	!	Die	1 +3	!	!	!

Bonne Vituaigne Chanronge. DESIGNATION : 10-852 EMPLACEMENT : Date de la vendange : 21-9-81 + 5

Poids de la vendance: 5,800 kg

Nombre de souches: 5

Ak 160

Date de Dégustation: 05 MARS 1982

Nombre de grappes: 26

225 g

OBSERVATIONS:

Couleur : B Indice réfract. : 18,4 (1°23) 10°4 note 2,38

Acidité du moût : 4,89

Pressurage
Densité: 1000

Date: 28-9

<u>Hise en bouteille</u>

Densité: 995°

Degré alcoolique : 40°5

Acidité du vin : 4,7 y 63-12

Designation: channonge

Clos Ac Planche & Côte 5 Rang 2 Souche 1 - 3 4 5

(A) BOURGEOUNE ENT.

Colonne

- 41 epanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 duveteux 8.

 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES NEUTLES DU ELUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche U fauves ou rousses 1 carminues: à liser, carmine o cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autress.

Dans le cas où la première feuille detachée est à liseré caraine, la couleur de la se et de la se feuille detachées sera notés.

Nº ordre

Désignation: chanconge

Clos 10 Planche 8 côté S rang 2 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3 / révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 ∋ntièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1) duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement(3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Parmer 5-107

Nº ordre

Désignation: chanconge

10 Planche 8 Côté 52 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré (- à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 5I - noeuds

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

Nº ordre

Désignation chavronge

Clos / Planche 8 Côté 5 rang 2 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan 🖒 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan (1) en gouttière 2 involuté (3).
- 36 Surface: unie I ondulée 2 finement bullée (5) grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 🖉 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90º 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gaussiand 3/63

Nº d'ordre

Chantonge

Désignation

Mo Planche Coté S Nº 2 souche 0 2 3 4 5

24 - Grosse 1 - Moyenne @ - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 8 - Campacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacéi- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré fl

BAIE

| Hit

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 🖏

27 - De couleur blanc (1) - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière / irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoide 3 tronccvoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9,

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale i régulière 8 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore () - coloré 2.

35 - A peau fine 3 - moyenne 4 - énaisse 5.

35 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 .. A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 nerbacéc6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 3 - court 3.

31 - A pádicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

51 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A panceau ; court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 . De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile &

garmerand 8/63

.. Côté 10..2.52. Rang souche 1-2-3-6-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2), moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment de adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2) à épines ou analogues (3), à peils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (8), saillants (4). Noeuds : gris (1); jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violace (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5). : pointus en dard (1), conique , arrondis 3. : marron 1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (), large (2). : saillant (1), effacé (6) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 11-64

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2010

Code cépage : 0Mtp222

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction: Chanronge

Emplacement: Vass3R13s186-190

Observateur:

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	Courses the whit)	26/3	28/3		
2	3	000	24/3		
3	6		24/3		
4	7	2dib 26/3	29/3		
5					
Moyenne			26/3		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			26/07	9/08	26/8	

_3

Formulaire de description 4/8

Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année: 2010

Observateur:

Lacombe.

Programme : GrapGene06 Nom introduction : Chanronge Code introduction: 0Mtp222

Emplacement: Vass3R13s186-190

L	П	VE	R	E

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	I-F. entière	2-Trois	3-Cinq	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	I- Nulle	2-Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ére} bifurc.	4- Après l ^{ère} bifurc.	rosé
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	I-Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	I-Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	Absente				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	Absente				Présente
Oiv 075	Cloqure du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	Nulle à t. Ib.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	Nulle à t. sb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	Nulle à 1 lb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	Absente				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	Absente				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	Nulle à t. lb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
		PETIOLE				

Oiv 090	Densité poils couchés	Nulle à ?. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
	Longueur pétiole p/r nervure médiane	CULLI	Plus court	Egal	Plus long	Beaucoup plus long
Vassal	Couleur du pétiole	1-coloré	2 partiellement coloré	3-vert		

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert	2- ouvert	3- peu ouvert	4- fermé		6- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base		1- en U	2- en accolade	3- en 📎		
Oiv 81-1	Dent sur le bord	1 Absence	2- Prése	ence assez fréquente de 1 ou 2 dents			
Oiv 81-2	Base dégarnie		Absence	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés		

SINUS LATERAUX SUPERIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus	2- ouverts	3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraus supérieurs	Absence	Peu profond	Moyens	Profonds	Très profonds
Oiv 83-1		1- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 83-2	Dent	1-Absence	2- Présence fréquente			

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme	1- côtés concaves	2- côtés rectilignes	3 notations 2+4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe
Oiv 077	Taille	Très petites	Petites	Moyennes	Grandes	Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues

AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE

01 001 77 1	Très faible	Faible	Moyen	Elevé	Très élevé
Oiv 501 Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	(<10%)	(11-30%)	(31-50%)	(51-70%)	(>80%)

Année : 2010

Code introduction: 0Mtp222

Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Observateur: TD pur table

Programme: GrapGene06 Nom introduction : Chanronge

 ${\bf Emplacement: Vass3R13s186\text{--}190}$

G	R	À	P	PI	Ē.

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm): 14 cm	Très courte (<10 cm)	(10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm): 10 cm	Très étroite (<5 cm)	Efroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moveme	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Comque ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une a trois	3- Plus de trois ailes		

BAIE

				DAIL			_			
Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm): 18 (en cm)			Très courte (<8mm)		Courte Movembe (8-14mm) (14-20mm)			Longue (20-26mm)	Très longue (>26mm)
Oiv 221	Valeur absolue (en em): 45 mm		Très étroite (<8mm)	Etroite (8-14mm)		Moyenne (14-20mm)		Large (20-26mm)	Très large (>26mm)	
Oiv 222	Uniformité de la grosseur		1-Non uniforme	3-Unifo						
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	2- Arrondic	Ellipsique	4- Ovoïde	4.	ronc- orde	6- Obovoïd	e Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme Vertjaune		2- Rose	3- Roug	ge	4- Gris		5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir	
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme			1- Non uniforme	Unifor					
Oiv 227	Pruine			Nul ou t. fb.	Faib	Faible Moyenne		gyenne	Forte	Très forte
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très minee	Mino	Mince Moyenne		Epaisse	Très épaisse	
Oiv 229	Ombilic (apparence)		1- Peu apparent	Appar						
Oiv 229	Ombilic (dépression)		I- Déprimée	2- No déprin						
Oiv 230	Coloration de la pulpe		1-Non colorée	2- Color	rée					
Oiv 231	Intensité de la coloration de la pulpe			Non coldrée	Faib colora			oyenne loration	Forte coloration	Très forte coloration
Oiv 232	Succulence de la pulpe		1- Peu juteuse	Juleu						
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)				Faible		N	Aoyen	Elevé	
Oiv 235	Fermeté de la pulpe		Très faible	Paible		M	oyenne	Elevée	Très élevée	
Oiv 236	Saveur		1-Aucune	2- Muse	-	-	Foxée	4- Herbacée	5-Autre	
Oiv 238	Longueur pédicelle		Très court (<4mm)	(4-8mm)			Aoyen -12mm)	Long (12-16mm)	Très long (>16mm)	
Oiv 240	Séparation du pédicelle		Très facile	Faci	le	N	Noven	Difficile	Très difficile	

PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins	1- Ab (type cor	sents inthien)	2- Rudin (type su	3-Présents	
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm): 54	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) :	Très faible (<10mg)	Faible (25mg))	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absertes	2-Présentes			

MB. 1 planti observable

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 2010 1/01/2016 Programme: GrapGene06

Observateur: Marchal

Code introduction: 0Mtp222

Nom introduction: Chanronge

Emplacement: Vass3R13s186-190

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : _

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue :

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »

N° d'ordre : 014208 Désignation : Chanrouge Emplacement : 40.8529

: (1) - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 : 10 - (11) L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus lateral Sup. : (21) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (0) - (1) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Nbre dents du point pét. à L3 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües